

傳氏眼科審視瑤函

傅氏眼科新視瑤函方自

卷之六目錄

迎風冷淚症

河間普歸湯 阿膠散 枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散 白殭蠶散 真珠散

無時冷淚症

菊花丸 麝香散

無時熱淚症

甘肅散子 椒茶丸

背雌赤爛症

防風通聖散 東垣碧天丸 紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散 疏風散濕湯 治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯 半夏茯苓天麻湯 夜光柳紅散

加減地黃丸 豆淋酒法 蠟花無比散

槐子丸 川芎石菖蒲散 摩風膏

因毒症

內疎黃連湯 還陰解勞湯

因他症

前胡犀角飲 堯蔚子丸 明目大補湯

東垣清神益氣湯 順經湯 磁石丸 羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯 局方黑神散 經效散 一綠散

瞽目飛揚症

經效四法

翳人目症

經效三法

原復症

洗肝散 洗心湯 瀉肺湯 六味地黃湯

通明散 東垣羌活除翳湯 明目流氣飲

神仙退雲丸 天王補心丹 加味六味地黃丸

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯 七宣丸 神功丸 小柴胡湯

二陳湯 溫白丸 川芎茶調散 四物湯

涼膈散 三黃丸 四生三寶瀉心丸

青州白丸子 瓜蒂散 普濟散 導痰湯

保命集當歸湯 保命集羚羊角散

傳氏眼科審視瑤函卷之六

秣陵傅仁宇九科纂補

婿張文凱廷獻叅閱

廣陵林長生聶震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵訂正

公猷 掄 全閱

大梁周靖公亮節較梓

體仁 節 全閱

運氣原證

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之氣

天政布風乃時舉民病泣出是也

目淚心者五臟之精也帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰

之道也心者五臟之精也目者宗脈之所聚也上液心者五臟之精也涕則宗脈感宗脈感則液道開

液道開故涕泣出焉。液者所以養精補髓空者也。故上液之道開則泣泣不止。則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣。故命曰奪精。補天柱經俠頸俠項中分也。又曰五臟六腑心為之主耳為之聽目為之視肺為之相肝為之榮脾為之衛腎為之主故五臟六腑之津液上滲於目。心悲氣并則心系急則肺舉肺舉則涕液上溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故淚而泣出矣。素問經精微論曰淚則目無所見夫火獨光也。陰氣并於下則足寒足寒則脈并於上則火獨光也。目昏盲是以氣衝風泣下而不止夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燭目故風見則泣下有翳比之夫火疾風生乃能雨此之類也。東垣云水斷木橫上為眼。溼為眩為淚此皆由肺金之虛而肝木寡於畏也。

迎風冷淚症

迎風冷淚水木俱虛血液不足寒藥勿施失治則重宜早

御之

此症謂見風則冷淚流若赤爛有障翳者非也水木二
經而液不足陰邪之患久而失治則有內障視渺等症
生焉與無時冷淚不同此為痰虛因邪引邪之患若無
時冷淚則內虛膽腎自傷之患也此宜服

河間當歸湯

治風邪所傷寒中目淚自出肌瘦汗不止

白朮

炒

白茯苓

乾薑

細辛

川芎

白芍藥

甘草

炙各五分

官桂

陳皮

各一錢

當歸身

酒製

人參

各一錢

右為劑水二鍾薑一片黑棗三枚煎八分去滓熱服不

計時服再服

阿膠散治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠 馬兜鈴各兩 紫苑 款冬花

糯米各一 白茯苓錢半 甘草五錢

右為細末每服二錢水一鍾煎不拘時服

枸杞酒治目視不明

枸杞子林肥者一斤杵爛再用絹袋盛貯須

陳無灰酒十斤

仍用猪肝煮熟切片蘸花椒鹽同食每飲酒一二盃勿

宜過飲若或過飲反佐濕熱為害不淺矣

按肝氣通於目肝和則能辨五色矣今肝為勞傷致目

視不明多由冷淚經同味為陰味厚為陰中之陰枸杞子味厚故足以養厥陰之陰者以純酒取其淡治氣血而已

迎風熱淚症

迎風熱淚由肝虛來火來水虧火隱伏久則成內災但此症不論何時何風見之則流熱淚若有別症及昏蒙者虛也乃肝膽腎水之津液不足故因虛發不密而風邪出其淚也中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治

有觸犯則有變矣宜服

羊三
角散
治肝臟受熱眼目昏花時多熱淚

羚羊角銼細末 羌活 玄參 車前子 山梔仁炒

黃芩 瓜蒌去心 胡黃連 家菊花各三錢 細辛一錢

右為細末每服二錢食後竹葉煎湯調下

白礬蠶散治衝風

白蠟蠶沙 粉草 旋覆花 細辛

木賊草 荆芥二錢半 嫩桑葉一兩

右為細末每服二錢白水煎食後溫服

珍珠散治肝虛見風淚出

珍珠另研 丹砂研各三分 乾薑研二錢 貝齒火煨水焯乾研一兩

右共研極細令勻以熱絹帛飛三遍每仰臥以少許點

眼中閉少時爲妙。

無時冷淚症

無時冷淚。水木俱傷。此幽陰之深患。其爲病也非常。然斯症每出不意。非青盲。今內障爲歿。

此症爲害無赤痛也。只是時常流出冷淚。久則視瞻昏渺。非比迎風冷淚。因虛引邪之害者。此蓋精液耗傷。肝氣漸弱。精膏澀枯。腎水不足。幽陰已甚。久而失治。則有內障青盲之患。精血衰敗之人。及悲傷哭泣久鬱。婦人產後悲泣太過者。每多此症。且爲禍交緩。人不爲慮。往往罹其害而禍成也。悔已遲矣。宜服。

菊花丸 治肝腎不足眼目昏朦視不明茫茫漠漠
常見黑花多有冷淚久服補不足強肝腎

甘菊花 去梗葉 四兩炒

巴戟 去心 三兩

肉蓯蓉 酒洗去皮焙 乾切二兩

枸杞子 搗焙 三兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服三錢溫酒或青鹽

湯空心食前送下

麝香散 治眼冷淚 不止喘鼻

香附子

川椒 各等分

蒼朮

麝香 各少許

右為細末合病者噙水一口將藥吹於鼻內

無時熱淚症

無時熱淚其禍幽微此損耗中有伏火乃不足中之有餘

服寒涼則傷汗損血服熱藥則血壅難歸當以意消息之
非徒補益所能消除。

此症謂目無別病止是熱淚無時而常流也若有別病
而熱淚出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎水
耗而陰睛虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其
汁也故膏液不足又哭泣大傷者每每患此久而失治
觸犯者變為內障因其為患微緩羅其禍也多矣宜服
當歸飲子。

當歸身

人參

柴胡

黃芩

白芍藥

甘草

大黃

各一錢

滑石

五分

右剉剉水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

椒地九治目昏多淚

熟地黃切焙乾

川椒去目及閉口者微炒

生地黃切焙乾

右三味各等分為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十

丸鹽米飲空心送下

江陵傅氏家貧貨紙為業好接待遊士一日有客方中布袍邀傅飲傅目昏多淚客教以此方服不一月

自能夜視物享年近九十聰明不衰

風治丹籛云風治眼系上膈有積熱自飲食中挾怒氣

益燥而水蓄於積而久也眼清氣不上升由是少生細小虫絲遂年久不愈而多瘵者是也用紫金膏以銀釵脚揩去油膩點之試問若果瘵者又當去虫以絕根水益紫金膏只去漫與去風涼血而

若前所謂飲食煖熱成疾又須更與防風通聖散去硝黃為細末以酒拌勻曬乾依法服之禁諸厚味及火料物方盡諸法之要

背帷赤爛症

背帷赤爛。背有之火。上燥濕病有重輕。重則背帷裂而血出。輕則背赤爛而難愈。以清潤而為治。何患病之不除。此症專言背之赤爛。目無別病也。若目有別病而赤爛者。乃因別病致傷其背。又非此比。赤勝爛者。多於勞心憂鬱忿怒無形之火所傷。爛勝赤者。多於性燥嗜酒哭泣過多。胃火冲烟風熱蒸薰有形之火所傷。病屬心絡甚則火盛而生瘡於背邊也。要分大小二背。相火君火

虛實之症宜服點洗

防風通聖散并治中風一切風熱大便秘結小便赤澀眼

風刺癰疹而為肺風或熱急生風舌強口紫或鼻生紫赤

防風 川芎 大黃 赤芍藥 連翹 麻黃去節

芒硝 蘇薄荷 當歸 滑石飛過 甘草 炒梔仁

白朮 桔梗 石膏 荆芥穗 黃芩各等分

有為粗末每服四錢薑三片水二鍾煎食前溫服按防

風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之出汗而泄荆

芥薄荷清上藥也風熱之在顛頂者得之涌鼻而泄大

黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之泄後而泄滑

石樨子水道藥也風熱之在決瀝者得之由瀉而泄風淫於肺肺胃受邪石膏粘梗清肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之爲患肝木主之川芎當歸和肝血也而甘草白朮又所以和胃氣而健脾劉守真氏長於治火此方之旨詳具悉載

如目兩臉潰爛或生風粟白睛紅赤黑睛生翳障加菊花黃連羌活白蒺藜名白菊花通聖散虛弱大便不結燥者減去硝黃

東垣聖方治目疾屢服寒涼不愈兩目黑熱有如火煎明畏日或上下臉赤爛或不眠水

寶和堂

卷之六

十一

瓦粉炒一

銅綠七分

枯白礬二分

右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉研勻熱水和之共為
丸如黃豆大每用一丸熱湯半盞浸十二時辰洗至覺
微滴為度少閉眼半個時辰許臨卧更洗之瞑目就睡
尤為神妙一丸可洗二三日可在湯內燒熱此藥治其
標為表熱已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱

紫金膏

一水飛過號升密多水少
武火熬以器盛之點

迎風赤爛症

迎風赤爛邪在肌因虛被毆木相傳久不愈今成赤爛并
爛風弦治又難

此症謂口不論何風見之則赤爛無風則好者與風弦
赤爛六胞結之深者不同夫風屬木木強土弱則易
侵侵則引邪內外夾攻土受木剋是以有風其病無風
則愈赤爛者土木之病也赤者木之火症爛者土之濕
症若痰若濕甚者爛勝赤若火若燥甚者赤勝爛心承
脾人乘金珠痛而赤焉此章專言赤爛之患與前章迎
風冷熱淚入內之深者又不同宜服洗

赤爛散
治眼腫濕爛因風
而作用氣藥屢之

柴胡

防風

赤芍藥

荊芥

羌活

桔梗

生地黃

甘草

石各等分爲細末每服三錢白水煎溫服

疏風散濕湯

赤芍藥

黃連

防風各五錢

銅綠另入

川花似

歸尾

錢各一

輕粉一分

羌活

五倍子

各三分

荆芥

六分

膽礬

明礬

各三

右爲一處水三鍾煎至一半去滓外加銅綠泡化後入

輕粉攪勻湯脚用綿紙濾過澄清可用手蘸洗目爛濕

處

方

治爛弦風眼

覆盆子不拘多少去梗日晒乾研令極細薄絹裏
兒所食之乳浸洗加人行九

治爛弦眼生翳方

聖之時方點目中翳即卧不週三
 四日視物如少年忌酒類山賊
 朱崇星起太尉乳母苦胸弦風服近二
 老娘過門云此服有正其細如絲色赤而長久則滋
 生乃入山取此藥咀嚼之而留汁存於竹筒內以
 皂紗蒙乳母眼取筆畫雙目於紗上然後滴藥汁清
 眼下次弦轉盼間重從紗中出其數十條後眼肉乾
 如常太醫上言法誅聞之有麟婦亦患此症試之無
 不立癒考之本草陳藏器云此藥治眼妙品也
 明令振推不止及青自等慈蓋治眼妙品也

覆盆子葉為末 乾薑 麝灰 生礬各半 枯礬一分

共研一處蜜調用絹片做膏藥貼眼上一夜次午揭起
 其翳自出粘在絹上次晚又將肥猪肉切片貼眼上
 宿即愈

敷爛弦眼方

藍甘石

取飛過

飛丹

五錢

枯礬

二錢五分

明硃砂

研細

銅綠

二錢

共為一處研極細為度先用荆芥陳茶葉煎水洗患處

乘濕將藥敷上二三次立愈

諸因

內外諸因種種不一有因七情六淫傷感過度而

起制致榮衛失調而淹滯溫濕瘰癧味不消宜散宜和

輕重各分其類總之火鬱者宜疏之氣滯者宜導之

燥甚風邪宜審虛實調之庶不至客邪延久成痼疾

風分風分何多。未傷人身先損目。有因胞皮爛弦紅有

此因

致偏喎並振搖有成內喎多齗肉內外輕重皆不同且之
常症猶難遷驅風活血養陰精勝似求仙去問卜

此症謂患風病人而目病也蓋風屬木木爲肝肝之竅
在目木火一氣病風則熱盛何也木能生火也火盛則
血內生風久而不熄遂致耗損矣況久病必生鬱鬱極
則生火火性上炎火熱極而又生風展轉相生內外障
翳皆起于此故患風木之病各因其故而發之有目淺
而鬱未深爲偏喎歪斜者有入脾眼胞反濕赤勝爛者
有血虛筋弱而振搖者有恣燥嗜熱火邪乖亂清和融
純之氣因鬱而爲內障者有風勝血滯結爲外障如努

肉等症者，再加以服餌香燥之藥，耽酒縱辛，不善保養，以致陰愈虧而火愈燥，火愈燥而風愈勝，病變為凝，瘵之重者，治當各因其證，而伐其本，且外內常變不同，大抵若因風病目者，當去風為先，清火次之，不然源既不清流，何能止。目病今雖暫退，後必復來，治之雖至再至，三風不除而火不熄，目終無痊愈之期矣，宜服

正容湯

治口眼喎邪，能容不正，服此即能正之，故云。

羌活

白附子

防風

秦艽

膽星

白僵蠶

半夏

製

木瓜

甘草

黃松節

即茯神心，木各等分。

右剉劑，白水二鍾生薑三片煎至八分，去滓加酒。

右方祛風以羌防化痰須星夏生草清熱秦艽榮筋面

部需白附、蠶蠶、舒筋急資木瓜松節、薑散風邪、酒行藥

勢此方服十劑平服如故敢陳一得願獻知音

半夏扶芩天麻湯

治痰厥頭痛頭旋眼黑煩悶惡心氣短

中或頭痛如裂身重如山四肢厥冷

天麻黃芪蜜製人參蒼朮泔水橘皮澤瀉白朮

炒麴各五分白朮炒一分半夏蜜製麥芽炒各錢半黃蘗酒製二分

乾薑炮二分

右剉碎白水煮二鍾煎至八分去滓食後服

此頭痛為足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋
 風虛內作非天麻不能除天麻苗謂之定風草乃治內
 風之神藥內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣實
 表虛止自汗人參甘溫調中補氣瀉火二米甘溫除濕
 補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中
 而升陽炒麴消食蕩胃中之滯氣麥芽寬中而助胃氣
 乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦寒用酒洗以療之冬日少
 火在泉而發燥也

夜光柳紅散 治風邪傷胞臉致風車
 臉翻不收山淚狂者

人參 荆芥穗 川烏 炮川 白芷 南星 製 吹石膏

川芎

各二兩

何首烏

草烏

去根

石決明

煅

藁本

川細辛

雄黃

當歸身

蒲黃

蘇薄荷

防風

茅蒼木

浸炒

甘松

藿香葉

全蠍

各二兩

羌活

三兩

右為細末每服二錢或三錢茶清調下

加減地黃丸

治男婦

肝臟積熱

肝虛目暗

膜入水輪

漏睛

及腎虛

眼見黑花

視物不明

濕痛冷淚

弱膜遮

氣眼並治之

兼治乾濕脚氣

由腎氣虛敗者

但服此能

補肝益腎

驅風明目神效

生地

煎者

熟地

乾者

石斛

去苗

防風

去蘆

枳殼

炒

生地

一斤

熟地

牛膝

酒洗

杏仁

泡去皮尖

麩炒黃入

瓦器研去油

各四兩

右為細末

除杏霜

另入

勿犯

鐵器

煉蜜為丸

如梧桐子

大每服五十丸空心以豆淋酒送下或飯飲及青鹽湯亦可忌一切動風毒等物

豆淋酒法

黑豆半升揀揀炒令烟出以酒三斤浸之不用黑豆用此酒煮獨活卽是紫湯也

唐丞相李基公在扈從蜀中日患眼或澀或生翳膜或疼痛或見黑花如豆大雲氣纏繞不斷或見如飛蟲翅羽百方治之不効有僧智深曰相公此病由受風毒去五臟實則瀉其子虛則補其母母能令子實子能令母虛腎是肝之母今腎受風毒攻令肝虛肝虛則目中黃惚五臟亦然和氣消中消風諸風等症皆由腎虛地黃丸主之

花無比散治大小男婦遠年近日一切風眼氣眼攻注眼目昏暗臉生風粟或痛或癢漸生翳膜遮

晴視物不明。及久患偏正頭風。牽掙兩眼。漸漸細小。連
連赤爛。小兒疳疹。人目白膜遮睛。赤瘤癰痛。常服此風
明目。

白茯苓

防風去蘆

甘草

蛇脫炙各四兩

白蒺藜炒

羌活

獨活

藥十三兩

蒼朮

片水浸去皮切

蟬脫去頭足

白蒺藜炒

羌活

獨活

藥十三兩

石決明用鹽入東流火炙一伏時

川芎

除石決粉條共為細末攪勻每服二三錢食後米泔調

下或茶清亦可忌食發風毒等物。

槐子九

酸棗仁核

蔓荊子

覆盆子

柏子仁

白蒺藜炒

車前子

牛蒡子

芫荽子各一兩

槐子九

酸棗仁核

蔓荊子

覆盆子

柏子仁

白蒺藜炒

車前子

牛蒡子

芫荽子各一兩

除石決粉條共為細末攪勻每服二三錢食後米泔調

下或茶清亦可忌食發風毒等物。

槐子九

酸棗仁核

蔓荊子

覆盆子

柏子仁

白蒺藜炒

車前子

牛蒡子

芫荽子各一兩

白蒺藜炒

車前子

牛蒡子

芫荽子各一兩

除石決粉條共為細末攪勻每服二三錢食後米泔調

下或茶清亦可忌食發風毒等物。

槐子九

酸棗仁核

蔓荊子

覆盆子

法因

見前

卷之

三

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸空心

白滾湯送下

川芎石膏散治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞

石菖蒲散防風散蕪荳蔻散連翹散桔梗散甘草散

寒水石散滑石散川芎散人參散荊芥穗散

當歸散黃芩散大黃散山梔仁散白米散菊花散

赤芍散縮砂仁散

除寒水石膏滑石各研細另人餘共為細末攪勻每服

二三錢食遠瀝白湯調服忌薑蒜辛熱等物

摩風膏治風痺

白芷 黑附子 廣木香 防風 細辛 骨碎補

當歸身 桑木各一兩 烏頭 赤芍藥 厚肉桂各一兩

牛酥即骨脂 鵝脂各四兩 猪板油半斤

除酥脂板油外以上諸藥各為細末用真麻油半斤浸一晝夜再入酥脂板油共熬以文武火熬如膏為度塗之於患處

因毒症

人為瘡瘍腫毒六陽壅塞勿寧血瘀氣滯不和平皆是元太甚水少不能制火故致炎熾飛騰只緣肝膽未純精邪濁擾侵致病

此症指人生瘡瘍腫毒累及目痛也。夫大陽火燥有餘，水不能制，以致妄亂無拘，氣滯血壅，而始發瘡瘍腫毒。火性上炎，目竅高火之所從泄，濁能害清，理之自然。肝膽清淨，屬和之腑，瘡瘍毒癰痘疹，濁邪熾盛，侵擾清利，因其素所斷喪，肝腎有虧，陰虛血少，膽之精汁不充，因化源竭，目絡無滋，火邪得以乘虛，故人目爲害。若病目在於病毒之時，治毒愈而目亦愈。若毒愈而目不愈者，乃邪入至高之深處，難以速退，當導其流而澄其源，若急迫治之，因而觸激甚者，必有瘀滯之變矣。宜服

內疎黃連湯

治諸瘡毒皮色腫硬發熱作嘔大便秘閉脈洪實者攻及兩眼或一目赤痛紅腫并

因

黃連酒炒

炒梔仁

黃芩

當歸身

桔梗

廣木香

檳榔

赤芍藥

甘草

蘇薄荷

各二分

連翹

製大黃

各錢二分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠服

還陰解毒湯

治梅毒瘡保毒未潰後害於肝腎以致蒸灼神水目眵腫赤紅繞白輪視物昏眩混濁不明

明

川芎

當歸

酒洗

生地黃

金銀花

去葉

連翹

黃芩

酒炒

土茯苓

細甘草

減半

黃連

酒炒

苦參

麥門冬

去心

白芍藥

酒洗

玄參

各等分

三

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

審視瑤函

卷之六

五

因他症

因他之症爲別病。內外輕重總不足。內因七情。外緣六淫。不斷不喪。順天和。能守能安。頗清淨。五味四氣慎其宜。不獨目明亦長命。戒慎恐懼如響如應。

此症專言因害別病而累及目也。所致不同。有陰病而陰白傷。有陽病而陽自損。有寒病熱藥太過傷其神氣。熱病寒藥太過耗其精血。補者瀉之。瀉則損其元。瀉者補之。補則助其邪。砭針之泄散真氣。炮灸之激動火邪。實貴虛虛損不足。益有餘之爲害。亦各因人觸犯感受。臟腑經絡衰旺。隨其所因而入爲病。內外輕重不等。皆

以因

驗其標而治其本譬如傷寒陽症熱極者損瞳神內症也熱甚血滯赤瘀內溫者外症也陰症脫陽而目直內症也服薑附溫劑多而火燥赤溫者外症也瘧疾之熱損瞳神內症也火滯於血而赤睛外症也精竭液耗而膏汁不得滋潤內症也山嵐瘴氣而昏者邪氣蒙蔽乎正外症也蠱脹中滿赤痛者陰虛難制陽邪內症也氣滯拂鬱熱多昏花皆內症也痰症之脈滯火症之赤澀皆外症也餘倣此嗚呼身之精血有限人之斲喪無窮故虛者多實者少明者少而晦者多若能知愛養之方而不犯禁忌之戒外不縱性以傷於五味四氣內不放

心於六慾七情順時氣養天和頗立清淨之志而存恒久之心則三真不喪而六賊潛消血充精固神足氣清陰陽和而水火濟精華盛而目力全復何病之有哉若久久不輟綿綿若存不獨目無病而瞻視明命亦長矣若治之須看因何症爲害於目則以本症治之難執方括亦不可拘定眼科藥法治之如傷寒陽症熱鬱蒸損瞳神則看是何經之熱分表裏攻發使其熱退則目自愈若必用眼科之藥其症壞矣餘症倣此

前胡犀角飲

治傷寒兩目昏暗或生浮翳

黃芪一錢二分蔓荊子

犀角銚末

青箱子

前胡

炒梔仁

防風 麥門冬去心 羌活 生地黃 細辛 車前子

菊花 草決明炒各八分 甘草四分

右剉劑。白水二鍾煎至八分。去滓。食後溫服。

羌蔚子丸治時氣後目暗及有翳膜

黃連兩 枸杞子 枳殼去穢炒 青箱子 生地焙各兩

羌蔚子 澤瀉各一兩 石決明煨 細辛 麥門冬去心

車前各二兩

右為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服三錢。食後漿水

送下。

明目大補湯治氣血俱損。眼目昏花。神光不足。及久患眼疾。服涼藥過多。氣血凝滯。昏朦。服此以領陽。

審視培山 卷之六

光壯
腎水

乾熟地

酒蒸

白木炒

白茯苓

焙

人參

白芍藥

甘草

炙

當歸身

酒洗

川芎

洗

白豆蔻

取肉

黃芪

蜜製

大附子

炮

沉香

厚肉桂

各等分

右剉劑白水二鍾生薑一片黑棗二枚煎至八分不拘

時溫服。

東垣清神益氣湯

治因脾胃虛弱之人。誤服洗肝散。或服寒涼藥多。而目愈病者。宜此。

白茯苓

人參

白朮

製各一錢

蒼朮

酒洗

白芍藥

升麻

防風

黃蘗

鹽水製

廣陳皮

各六分

青皮

各六分

甘草

炙

冬心

五味子

肥者打破。各五分。

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓溫服

順經湯治室女月水停久倒行逆上中咽

當歸身 川芎 柴胡 桃仁泡去尖 香附子 烏藥

青皮 紅花 廣陳皮 蘇木 赤芍 玄參

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓加酒一盃食遠溫服

熱甚加酒炒黃連煎服

磁石丸治眼因患後起早元氣虛弱目無翳膜視物昏暗欲成內障

肉蓯蓉剉去皺皮酒浸一宿焙乾一兩 磁石細研水飛過二兩

鬼絲子酒漬五日曝乾 巴戟心去遠 智肉 熟地黃焙乾

石斛各一兩 桂心 遼五味 廣木香 甘草炙赤色各五錢

砂因

見...

除磁石兔絲子末另火餘共為細末和勻煉蜜為團仍
搗二三百杵丸如梧桐子大每服三四十九食前溫酒
送下或新鹽湯亦可。

羊肝丸

治肥人酒色太過紅筋侵目
氣毒傷目白膜傷睛者并治。

白蒺藜

炒去刺

菊花

去根

石決明

生地

各一兩

楮實子

槐角

炒

五味子

黃連

當歸尾

各五錢

防風

荆芥穗

各二錢

甘草

一錢

真川芎

三錢

桑仁

去殼油
淨七錢

右共為細末用雄羊肝一具滾水沸過共煎藥搗為丸
每服五六十丸空心薄荷湯送下

忌椒薑辛辣燒酒等物。

物損其睛症

物損其睛症。傷之在目輪。白黃兩般。黃急白緩。行雲然。傷得重。損壞在瞳神。縱然醫得速。終必欠光明。

此症謂目被物觸打。傷在風輪之急者。故曰物損其睛。有黃白二色。黃者害速。白者害遲。若尖細之物。觸傷者。淺小可治。若龐大之物。傷大而深。內損神膏者。重。雖愈亦有痕跡。若觸之破珠。爲害已甚。縱然急治。瞳神雖在。亦難免欹側之患。物雖尖小而傷深膏破者。亦有細細黑點如蟹睛而出。愈後有疤。每見耘苗之人。竹木匠輩。往往誤觸竹絲木屑。苗葉在風輪而病者。若飛流之物。

掩人而致破風輪者必致清黃珠出狀若稠痰白脂凝
在風輪欲流不流此是傷破神珠外邊氣分之精膏也
不可誤認爲障若神昏者瞳神有大小欹側之患久而
失淚目必外凸大凡此症不論大小黃白但有流淚赤
障等病者急而有變珠痛頭疼者尤急也宜服

加味四物湯

治打損
眼目

白芍藥

川芎

當歸身

荆芥

熟地黃

防風

等分

右咬咀爲劑白水二鍾煎熟去滓再入生薑黃搗汁少
許溫服。

外又可以生地黃一兩杏仁二十粒泡去皮尖研爲細

未用水調稠綿紙攤藥敷在眼上谷粒。

局方黑神散

熟地黃

蒲黃

歸尾

乾薑炮

赤芍藥

肉桂

甘草

稍各等分

右為細末量病之輕重大小以蜜便生地黃汁相和冬

煎調服

經効散

治眼因撞刺生翳疼痛無時經久不安復破物者所繫兼為風熱所攻轉加痛楚不能睜眼見物等

疾

柴胡

兩

犀角

三錢

赤芍藥

當歸尾

大黃

各五錢

連翹

甘草

稍各二錢五分

右為末每服二三錢白水二鍾煎食遠服

綠散

治打撲傷損眼胞赤腫疼痛

芙蓉葉

生地黄各等分

石二味共搗爛取眼胞上或為末以雞蛋清調勻敷亦可

瞼目飛揚症

瞼目多因山路行風吹砂土入人睛頻擦頻拭風輪寢氣滯神珠膏血凝昏目不爽漸漸病生成

此症因風吹砂土入目頻多揩擦以致血氣凝滯而為病也初起紅腫赤脈次復淚出急澀漸重結為暗翳然

有輕重赤白亦因人之感
觸所致皆陰形症別經絡
其形症而治其本末也

經効四法

孫真人治瞤目腫與或置於
水中浸之視水其物立出
于金帛相麥芒入眼以新
將蟬蛻從布上摩之其芒
山居物落眼中用
新筆蘸水自出
又方用上好椒
所濃點之立出

飛絲入目症

偶被遊絲入目皆緣沒意隄防
模糊昨午淚如湯瀝急
癢腫眼那更羞明怕熱頭疼
珠痛難當金歪老鶴定珠傷

因

審視瑤函

卷之六

三

惡毒無如這樣

此症謂風颶遊絲偶然撞入目中而病痛也卽今人呼爲天絲打眼昔野垂蜘蛛等虫之絲其患尙遲若金蚕老鶴絲當日不出三日必珠裂破碎今人但患寒風暴熱天行赤熱痛如鍼刺一應火實之症便呼天絲入目殊不知飛絲入目乃人自知者但迴避不及不意中被其人也入目之時亦自知之倏然而痛脹湧難開又非木偶人豈有不知今之愚人不得理之有無但以已遺謬呼人疾失之甚矣

凡溪治飛絲入眼紅腫如
絲白或一塊看眼白上
輕拭出則愈如未盡再塗
治飛絲入眼用拓樹漿點
裏筋頭蘸水入目內擦拭
又方晚絲入目以火麻子
調一碗浸置却將舌浸水
中延抹自出立效

時復症

若言時復症歲歲至期來莫言無後患終久變成災

此症謂目病不治延捱忍待自愈或治不得法色慾有
犯觸其脈絡遂致深入又不急治致邪正擊搏不得發
越積日久至其時目則如花如剝及期而發過期而
又愈久而不治及因激發者遂成其害未發問其所發

之職別其病本在何經絡既發者當驗其形色經絡以
別何部分別症候施治或

發於春宜服

洗肝散治風毒上攻暴作目腫

常歸尾酒洗川芎 蘇薄荷 甘草生地黃 羌活

炒梔仁 大黃制龍膽草 防風各等分

石為細末每服三錢白滾湯送下

發於夏宜服

洗心湯治心經煩熱口

黃連 生地黃各一兩木通 炒梔仁各一兩 甘草生

當歸尾

菊花各一錢

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

發於秋宜服

瀉肺湯

治暴赤客熱外
隨台晴腫脈

川羌活

玄參

藜蘆各一錢半 桔梗

地骨皮

大黃

芒硝各一錢

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠服

發於冬宜服

六味地黃湯

治腎水不
能制火

熟地黃

山茱萸一核 山藥

澤瀉

白茯苓

牡丹皮各等分

右劉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

以上四時雖定四方不必拘執仍須視其時症診其臍

臍相尅然後加減更變施治可也

通明散

治氣眼凡人之目必患後傷其經絡喜怒哀樂之情多有傷於心肺發作不時此乃氣輪受病之故

升麻

炒梔仁

各一兩半

細辛

川芎

白芷

草決明

防風

白芩

白歛

夏枯草

羌活

各一兩

蟬退

去頭足

烏梅皮

五倍子

各五錢

甘草

二錢

右爲細末每服三錢白水一鍾半淡竹葉七片同煎食

後溫服

腫痛赤脈從上而下太陽病者服

東垣羌活除翳湯

治太陽寒水翳障
惡晴不能視物

麻黃根

五分

薄荷

四分

生地黄

七分

川芎

當歸身各六分

黃蘗

酒製八分

荆芥穗

酒製八分

木錢

各一分

川羌活

一錢五分

防風

北細辛

二分

知母

酒製八分

川花椒

五分

右剉劑白水二鍾煎至八分

加荆芥穗再煎去滓食遠

稍熱服忌酒辛熱濕麵等物

腫痛赤脈從下而上陽明病者服

明目流氣飲

治月經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕熱羞明堆積赤

腫隱澀難開或生障翳倒睫拳毛眼眩赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作服煎並宜服之

此因

薛見錄

卷之六

三

蒼朮

米泔水浸一宿土炒二錢

細辛

牛蒡子

炒 大黃

川芎

錢

防風

白蒺藜

炒去刺

梔仁

炒 黃芩

補骨脂

蔓荊子

月

甘草

木賊

玄參

各七

草決明

錢

右剉劑白水二鍾加酒一小盞煎至八分去滓臨睡溫服

服

腫痛赤脈從外走內少陽病者服

神仙退翳丸

治一切翳膜內外等障昏無光者

荆芥穗

蛇脫

密蒙花

各二錢此三味同仕草焙乾揀去甘草不用

川芎

當歸身

各一兩半 枳實

蘇薄荷

不見 犀角

錢末

川練子

蟬退

各一兩

家菊花

各五錢

生地

酒洗

焙乾

白茯苓去節二兩並便 羌活 地骨皮各三錢 鎮仁生山六錢

木賊去節二兩並便

右為細末煉蜜為丸每一兩重分作十九粒米泔湯調服

日進二三丸俱食後服婦人用當歸湯化下有氣者麝

木香湯化下佐使在人消息活錢

天王補心丹市心血不足神志不安津液枯竭健忘怔忡

等症能清三焦化痰瀉火去煩

當歸身洗 天冬去心 柏子仁炒 麥冬去心 酸棗仁炒各二兩

丹參微炒 揀人參去蘆 玄參微炒 白茯苓 遠志去心

通五味乾 桔梗各五錢 生地黄四兩 辰砂五錢研細為衣

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大空心每服三錢白
湯送下或龍眼湯俱佳

忌胡荽大蒜蘿蔔魚腥燒酒

心者神明之官也憂愁思慮則傷心神明受傷則玉不
明而十二官危故健忘怔忡心主血血燥則津枯故大
便不利舌爲心之外候心火炎上故口舌生瘡是凡以
生地爲君者取其下入足少陰以滋水主水盛可以伏
火況地黃爲血分要藥又能入乎少陰也東仁遠志相
仁養心神者也當歸丹參玄參生心血者也二冬助其
津液五味收其耗散參耆補其氣虛以桔梗爲使諸欲

因

載諸藥大心不使之速下山如日病日久不瘥以致虛甚可間服後加味地黃丸並進

加味六味地黃丸滋陰固精明目不寒不熱平和不劑久服延年

乾生地酒製八兩秋苓乳蒸各三兩山萸肉酒洗各四兩

牡丹皮酒洗各三兩澤瀉各三兩枸杞子焙乾各六兩菊花各六兩

遼五味焙二兩半茯苓炒去刺五兩

除地黃膏另入條為細末煉蜜為丸如桐子大每服三

四錢空心淡鹽湯送下虛甚者地黃丸內再加紫河車

一具酒洗極淨碎碎內酒水煮爛搗如泥或焙乾為末

丸九臨晚睡服天王補心丹

眼科針灸要穴圖像

二方補腎不知補心然心者君火也

正頭風及腦痛



此症針後或一二日再發如前痛甚蓋頭為諸陽所會
宜先補後瀉又宜瀉多補少或錯補瀉再發愈重當更

針百會合谷上星三穴瀉之無不効也初發宜刺上星
太陽

正頭痛且發又外又發且外發則心刺療如不然難治
也端的正頭風十死之症又名腎厥頭痛

口眼斜



頭痛頂痛



此症皆因醉後睡臥當風。串入經絡。痰飲灌注。或因怒氣傷肝。房事不節。宜先刺額車合谷。地倉人中。如不愈。再刺地倉。合谷。承漿。童子頭。

此病乃陰陽不分風邪中人膈戶故刺不効先取其熱
後去其風自然効也宜先刺百會後取合谷不効再刺
風池合谷三里。

頭風日月眩



[illegible]

眼障外



此乃頭風。能注瞳人血氣。湧溢上盛下虛。故得此疾。宜

刺太陽睛明合谷小骨空不效再刺臨泣損竹三里

眼生翳膜

睛明



此症受病既深未可一時便能針愈先刺睛明合谷不
效須是三次針之方可如法再刺太陽光明

迎風冷濕



此症乃醉後當風或暴赤眼痛不忌房事過食熱物婦人多因產後當風坐視賊風串入眼中或行經與男子交感穢氣冲於頭目故成此疾宜刺攢竹合谷大骨節

小骨空如未愈全再刺小骨空

入氣

暴赤腫痛眼



此症乃時氣所作血氣壅滯當風睡臥饑飽勞役宜先
刺合谷三里太陽睛明不効後再刺攢竹太陽絲竹空

紅腫爛沿眼



此症乃醉飽行房氣血凝滯用手揩摸賊風串入故有此症宜先刺合谷二間不效再刺睛明三里

肉 障 眼



此症乃怒氣傷肝血不就合腎水枯竭血氣耗散初病不謹恣食房事用心過多故得難治先宜刺臨泣睛明合谷瞳子窠却不效刺光明風池

羞明怕日服



此症乃暴痛在路迎風串入眼中血不就舍肝不藏血
 觀燈則淚出見日則酸澀痛疾難與宜刺攢竹合谷小
 骨空二間不愈再刺睛明行間

偏正頭風



此症乃痰飲停滯胸膈，賊風串入腦戶，偏正頭風發來，連半邊皮肉疼痛，或手足沉冷，久而不治，變為癱患，亦分陰陽針之，或針力未到，故不効也。此症宜先針風池。

台谷絲竹空後可針三里瀉之以去其風針後穴前
 絲竹空點

紅腫疼痛眼



此症因傷寒未解却有房事上盛下虛氣血壅上或頭

風不早治則血滯婦人或暴赤腫痛或怒氣傷肝房事
傷腎脾胃二經飲食不節饑飽醉勞皆有此症心火炎
上故不散及婦人產後怒氣傷肝產期未滿非一時可
療漸而為之無不効也宜先刺睛明臨泣合谷不愈再
刺風池太陽行間

百會

一名三陽五會一名顛上一名天滿在前頂後一

寸五分頂中央旋毛心容豆許直兩耳尖上對是

穴○督脉足太陽之會手足少陽足厥陰俱會於

此○刺二分灸五壯甲乙經曰刺三分灸三壯

日灸頭頂不

得過七七壯

主治頭

風頭痛

合谷

一名虎口在手大指次指岐骨間陷中○手

陽明所過為原○刺三分留六呼吸三壯

主治偏正頭痛面腫目翳神氣總去治
不明席弘賦云晴明治眼若未効合谷光明不可
缺千金十一穴云曲池兼合谷可徹頭痛馬丹陽
天星十二穴去療頭疼并面腫體熱身汗山目暗
視聾

上星

一名神堂在鼻直上人髮際一寸陷者中可容豆
○刺三分留六呼灸五壯一云宜三稜鍼出血以

治諸陽
熱氣

神庭

主治頭風頭痛鼻塞目眩睛痛不能遠視三
稜鍼刺之即宜泄諸陽熱氣無令上衝頭目
直鼻上入髮際五分髮高者髮際是穴髮低者加
二三分○督脉足太陽陽明之會灸三壯禁利利

之令人顛狂日失明
日灸七壯至三七壯止
主治發狂登高妄走風癩癰疾角弓反張目上視
不識人頭風鼻淵流涕不止頭痛目淚煩滿喘渴
驚不
得度

噎子膠

名太陽一名前關在目外去目五分○手太

主治頭痛目赤外背赤痛翳

頰車

一名機關一名齒牙在耳下曲頰端近前陷中側

七壯壯如小麥

不治中風牙關不開失音不語口眼歪斜頰腫牙

痛不可嚼物頸強不得巨頤凡口眼歪斜者嚼則

地倉

王龍賦云兼地倉瘰癧口歪

久患風其脈亦有不動者○手足陽明任脈陽蹻

之會○刺三分留五呼灸七壯或二七壯重者七

七壯病左治右病右治左及壯宜小如粗銀脚若

過大口反啗却

灸承漿即愈

主治偏風口眼斜牙關不開齒痛頸腫目不得

閉失音不語飲食不收水漿漏落眼瞤動連視眩

疏昏夜

無見

後頂

一名交衝在百會後一寸五分枕骨上○刺二分灸五壯

主治頭項強急額顙上痛

偏頭痛惡風目眩不明

臨泣

在目上直入髮際五分陷中正睛取之○足太陽小陽陽維三脉之會○刺三分留七呼主治鼻塞

目眩生翳多淚流冷淚眼目諸疾驚癇

反視百證賦云兼頭維可治目中出淚

足三里

即下陵出本輪篇在膝下三寸胫骨外廉大筋內宛宛中坐而堅膝低謝取之極重按之則踣

上動脉止矣○足陽明所入為台○刺五分留六

呼灸三壯千金云灸二百壯至五百壯○一云小

兒忌灸三里三十外方可灸不爾

則生疾○秋月不宜出血恐下虛

主治胸胃中脘熱與氣衝巨虛上下廉同秦承祖

自膝膺痠痛日不明外臺明堂云人年三十已後

若不灸三里令上氣衝目使

眼無光蓋以三里能下氣也

在耳後顛顛後腦脊下。髮際陷中。按之引耳。一
耳後陷中。後髮際。玄筋外廉。足少陽陽維之會
刺四分灸三壯

七壯注不用大

主治中風偏正頭痛頸項如拔痛不得回目
眩赤痛淚出通玄賦云頭暈目眩覺風池

翳

一名目翳。在耳後陷中。甲乙經曰。足少陽脈
氣所發。刺三分留三呼。禁灸灸不幸令人目

盲

主治頭痛目赤目眩視物瞀瞀。拳毛倒睫。風病戴
眼發狂吐涎沫。偏正頭風通玄賦云治偏頭難忍

一傳主眼赤痛
鍼一分出血

人中

一名水溝。在鼻下人中陷中。督脈手足陽明之
會。刺三分留六呼。得氣即瀉。灸二壯。至七壯。炷

如小麥然

灸不及鍼

主治中風口噤牙
關不開口眼喎斜

承漿

一名天池。一名懸漿。在頤前下唇稜下陷中。凡

陽明任脈之會。刺三分。留五呼。灸三壯。日可七

壯。至七七壯止。其血脈即通。其風應時

立愈。艾炷不必大。但令當脈。即能愈疾。

主治偏風。半身不遂。口眼歪斜。口

迎香

一名衝陽。在禾膠上一寸。鼻孔旁五

分。手足陽明之會。刺三分。禁灸。主

治鼻塞。不聞香臭。喘息不利。偏風。中

客主人

一名上關。在耳前起骨上廉。開口有

口取之。手足少陽陽明三脈之會。刺

三分。刺之則法不能欠者。即此穴。刺一

呼。灸三壯。甲乙經口刺上關。不得深。下關

角孫

在耳廟中間上髮際下。開口有室。手太陽手足

又司房太陽有八耳衛齒者名曰角孫則足太陽脉亦會於此。○刺三分灸三壯。

主治目生翳齒齲腫不

光明

在足外踝上五寸。○是少陽絡。別走厥陰。刺六分。留七呼。灸五壯。

主治熱病筋引。眼云睛明。治眼未効時。合谷光明不可缺。標兩眼云兼地五會。治眼養痛。

地五會

在足小指次指本節後陷中。去使聲一寸。○刺一分。禁灸。

主治標兩眼云兼光明。治眼養痛。

毫

尖如蚊喙。取法於

鍼



毫毛長一寸六分。治

式

寒凝痛。卸在絡。

解絡

一名鞋帶。在衛陽後。一寸五分。足腕上。繫鞋帶處。陷中。一日在足大指次指直上。肘上。陷者腕腕中。

刺痛論註曰在衝陽後三寸半氣。計凡二寸
生甲乙經曰一寸半。足陽明所行。經。刺五
分留五呼。

灸三壯

主治風氣。面浮頭痛。目眩。生翳。神農經
云治腹脹。脚腫。痛目眩。頭痛。可灸七壯。

豐隆

在外踝上八寸下廉。胫骨外廉陷中。
陽明絡別走太陰。刺三分灸三壯。

主治頭痛。向肺氣逆。面狂。見鬼。好
笑。百證賦云。兼強開治頭痛難禁。

攢竹

一名始光。一名員柱。一名夜光。一名光明。在兩眉
頭稍穴宛宛中。刺一分留五呼。不宜灸。甲乙經

云。明堂用細三稜鍼刺之宜泄。
熱氣。眼目大明。宜刺三分出血。

主治目視眩。淚出。目眩。肺癰。瘰癧。眼中赤痛。及眼
睛動。動不舒。主龍鳳云。兼頭維。治目疼。頭痛。百證

賦。三稜。三間。可治目中翳膜。
通玄賦云。腦昏目赤。涼。

眉中

在兩眉中間。神農經。治小兒急慢驚風。
可灸三壯。艾炷如小麥。王龍賦云。善治驚風。

睛明

一名淚孔在目內眥眦處云內眥與外眥各一分路氣府論註曰手足太陽足陽明於睛陽經五脉之

會刺一分半留六呼

乙經曰刺六分一曰禁灸

主治目痛視不明見風淚出努肉攀睛白睛昏痛

之痛引眼目腫凡治雀目者可久留鍼然後速出

不可使百證賦云兼行間可治雀目

夾鼻孔八分直瞳子○陽蹻足陽明之會○由

此入上齒中後出循地倉○刺三分灸七壯

主治痰癰鼻頰腫痛目閉目瘡青盲無見

遠視疎明而風鼻頰腫脚氣膝腫腫痛

大骨空 在手大指前二節前尖上屈

主治黃疸腹

痛及吐瀉

小骨空 在手小指第二節前尖上屈

主治迎風冷淚風眼爛弦等症已

上大骨空二穴宜口吹火熨之

後谿

在手小指末節後外側橫紋尖上以中節手傳金

取之一云在手腋前外側拳尖起骨下陷中○王

太陽所注為輸○刺一分

留二呼灸一壯一云三壯

主治目翳鼻衄耳聾通玄賦云治頭項立安捷步

云肺與三焦熱病腎虛頭痛肝厥頭暈及頭目昏

沉偏正頸風寒兩額顛眉角疼痛太陽痛頭項

拘急痛引肩背臂後頭風嘔吐不止惡聞人言眼

赤痛衝風

淚下不已

行間

在足大指間動脈應手陷中一云在足大指次指

岐骨間上下有筋前後有小骨尖其穴正居陷中

有動脈應手○足厥陰所陷為

禁○刺三分留十呼吸三壯

主治中風口喝四逆隘乾煩渴膜不欲視目

中淚出百證賦云非睛明可治雀目汗氣

一各間谷在食指末節前內側陷中○手

陽明所陷為榮○刺三分留六呼吸五壯

主治目黃口乾口眼喎斜

通玄賦云治目昏不見

或問曰：晴明迎看，若泣經竹，若禁灸何也？曰：穴近
目，目畏火，故禁灸也。以是推之，則知晴明不可灸。凡
灸頭面之艾炷，宜小，麥六不宜多灸。蓋頭面爲諸陽之
首，故也。若四肢炷，稍大。背腹則又大，不妨多灸。四肢多
灸，則枯細；瘦人春夏之月，刺宜淺；肥人秋冬之月，刺宜
深。此行針灸之大法也。

古人灸艾，佳火便用洗法，以赤皮葱薄荷葉煎湯溫洗瘡
週圍，約一時久，令驅逐風散於瘡口出，更令經脈往來
不澀，自然疾愈。若灸火退痂後，用東南桃枝青嫩皮煎
湯溫洗，能護瘡中諸風。若瘡內黑爛，加胡荽煎洗，若瘡

不可忍加黃連煎洗神效

古人貼灸瘡不用膏藥要得膿水出多而疾除實生云
用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬用兔腹下白細毛或無
腹細毛今人多以膏藥貼之日兩三易欲其速愈此非
治疾之本意也但今貼膏藥意在避風亦取其便惟
久貼之可也

鍼灸避人神論

千金云欲行鍼灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌
相犯則可故男忌除女忌破男忌戊女忌巳有月神忌
有每月忌有十二時忌有四季人神有十二部位人神

九部傍通人神有雜忌傍通人神有血支血忌之類凡
醫者不能知此避忌若逢病人危會男女氣快下手至
困通人達士豈爲此哉若遇卒暴急患皆不拘禁忌許
希云卒暴之疾須速灸療一日之間止忌一時是也千
金云癰疽疔腫喉痺客忤尤爲急切凡作湯藥宜速不
拘忌避又曰凡卒暴急症并中風卒仆痰厥等症卽用
鍼灸治療若論忌神少緩則不可救此所以不可拘泥
也若平居從容治病於未形選吉日避人神可也
取十二建人神之忌時

建日在足禁哺時

除日在眼禁目入

滿日在腹禁黃昏

平日在背禁人定

定日在心禁半夜

執日在手禁雞鳴

破日在面禁平旦

危日在鼻禁日出

成日在唇禁食時

收日在頭禁寅時

開日在耳禁午時

閉日在目禁日昃

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯

治諸虛百損紫胃不和形體羸瘦面色痿黃

熱而煩心忪多汗飲食進退寒熱往來喘嗽吐血遺精
失血婦人崩漏經候不調凡病後不爽及憂慮傷動血
氣此藥平補有効

白茯苓

白朮土肉桂皮

去蘆

川芎

當歸身

人參

黃芪蜜製白芍熟地黃甘草炙各等分

右剉劑水二鍾。生姜三片。黑棗一枚。煎至八分。去滓溫服。不拘時候。

按經曰。氣主煦之。血主濡之。故用人參。白朮。黃芪。茯苓。甘草。甘溫之品。以補氣。氣盛則能充實於肌肉。用當歸。川芎。芍藥。地黃。肉桂。味厚之品。以補血。血生則能潤澤其枯矣。

七宣丸。治風氣結聚。宿食不消。兼砂石。皮毛在腹中。及積聚。心腹疼痛。冷如冰。石。脾氣衝心。煩憤。悶亂。頭旋。目眩。肩背重痛。心腹脹悶。胸膈閉塞。風毒腫氣。連及頭。面。大便或秘。小便頻時。渴。肺有氣。痞。不能飲食。脾氣轉筋。悸。怔。怔。怔。不安等疾。

身加王下 醫方卷之六

錦紋大黃十五兩 甘草二兩 柴胡去苗 訶梨勒皮

枳實焙 木香各五兩 桃仁泡去皮尖

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二三十九食速

臨臥米飲送下漸增至四五十丸取宜利為度覺病勢

漸愈則止服不問男女老少並宜服之量虛實增減

神功丸治三焦氣壅心腹痞悶大脚風熱大便秘不通腰腿

臥不安及治脚氣并

素在風人大便結燥 火麻仁二兩 人參三兩 錦紋大黃焙

訶梨勒皮取乾皮

右為細末另入麻仁膏擦勻加煉蜜為丸如梧桐子大

每服二三十九滾曰湯或溫酒米飲皆可送下食

臥時服如大便不通可倍九服以通利為度

小柴胡湯

治傷寒溫熱病身熱惡風頭項強急胸滿

秘經或過經不解或潮熱不除及產後勞復發熱瘧疾婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時

產後傷風

并宜服之

柴胡

去蘆

人參

去蘆

甘草

炙

黃芩

各三兩

半夏

湯泡七次洗

乾二兩五錢

右剉劑或為麤末每服三五錢水二鍾生薑三片棗

一枚去核同煎七分去滓溫服不拘時候小兒分作二服

量其大小多寡

按邪在表則惡寒邪在裏則發熱邪在半表半裏則

寒且熱故令寒熱往來少陽之脉行於兩脇故令脇痛其經屬於膽膽汁上溢故曰苦膽者肝之腑在五行爲木有垂枝之象故脉弦柴胡性辛溫辛者金之味故用之以平木溫者春之氣故用之以入少陽黃芩質枯而味苦枯則能澤苦則降君以柴胡則入少陽矣然邪之傷人常乘其虛用人參甘草者欲中氣不虛邪不得復傳入裏耳是以中氣不虛之人雖有柴胡證而人參在可去也初人表裏氣逆而煩嘔故用半夏之辛以除嘔逆半夏表裏則榮衛爭故用葛根之辛其以和榮衛

陳湯

治痰飲爲患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快或發熱與或四食生冷脾胃不和

半夏

湯泡洗七次姜汁炒

廣順皮

湯泡去白各一錢半

甘草

炙七分

白茯苓

石剉劑水二鍾生薑三片烏梅一箇同煎至六分去滓

不拘時溫服

按水穀入胃無非濕也脾土旺則能運化水穀上歸於肺下達膀胱無濕氣之可留也惟夫脾弱不能制濕則積而為痰飲半夏之辛能燥濕茯苓之淡能滲濕甘草之甘能健脾陳皮之辛能利氣脾健則足以制濕氣利則積飲能行東南之人多有濕飲之疾

故丹溪恒主之其曰加升提之劑者亦清氣升而濁自降之謂

按此湯乃治一身之痰，都管之要藥也。欲下行，加引下

藥，黃柏、木通、防己之類，欲上行，加引上藥，升麻、柴胡、防

風之類。又曰：二陳加升降之藥，能使大便潤而小便

溫白丸

治心腹積聚，久感癰塊，夫如杯碗黃疸，宿食朝

攻兩脇，十種水病，八種痞塞，細胃吐逆，飲食墮，五種

淋疾，九種心痛，積年食不消化，或痛或癢，連年不瘥，及廉

一、切諸惡身，體煩痺，不知痛癢，或牛身不遂，或肩髮墮

落，及療七十二種風，三十六種通尸，疰忤及癰，癰或婦

人諸疾，臨經不，生帶下，淋瀝，五邪，煩心，愁憂，思慮，意思

不樂，飲食無味，月水不調，及腹中一切諸氣，有以裏孕

川烏頭

二兩五錢

紫苑

柴胡

石菖蒲

厚朴

去皮

吳茱萸

洗炒

乾薑

炮

黃連 人參 白茯苓 肉桂去粗皮 巴豆去心及膜出

蜀椒去目及明已者微炒去汗各五錢

右為細末另入巴豆并勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三九薑湯送下食後臨臥服漸加至五九七九通利則止再縮減回服

川芎茶調散治男婦小兒諸風上攻頭目昏重偏正頭搖

助膈熱痰感婦人血風攻注太陽穴疼但是感風者悉皆治之

蘇薄荷去梗取葉不見水八兩 防風三兩 白芷 川芎活

甘草炙各二兩 細辛去蘆八錢 川芎 荆芥穗各四兩

右為細末每服二錢食後茶清調下或薑葱煎服亦可

一方加菊花研蠶蠟退名曰菊花茶調散常服清頭目

四物湯

能調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調崩

將息失宜胎動不安血下不止及產後榮虛風寒

內搏惡露不下結生瘕聚少腹堅痛時作寒熱

當歸身去須臾白芍藥酒洗川芎酒洗乾地酒蒸各

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

按是方治血分之聖藥也用當歸引血歸肝經川芎引

血歸肺經芍藥引血歸脾經地黃引血歸腎經惟心生

血肝納血脾統血肺行血腎藏血男子化而為精女子

化而為月水血有形之物屬乎陰故名曰四物湯

經云氣血人身之二儀也天地之道陽常有餘陰常不

足人與天地相似故陰血難盛而易虧是方也當歸芍藥地黃味厚者也味厚爲陰中之陰故能生血川芎味薄而氣瀝爲陰中之陽故能行血中之氣然草木無情何以便能生血所以謂其生血者以當歸芍藥地黃能養五臟之陰川芎能調榮衛中之氣五臟和而血自生耳若曰四物便能生血則未也師云血不足者以此方調之則可若上下失血太多氣息機微之際則曰物禁勿與之所以然者四物皆陰陰者天地閉塞之令非所以生萬物者也故曰禁勿與之

涼膈散治男婦小兒不勝積熱煩燥多渴面熱頭昏唇焦
口咽燥舌腫喉閉目赤疼痛鼻衄頰頰結硬口舌生

瘡痂實不利涕唾稠粘睡臥不寧譫語狂妄腸胃燥澀便溺秘結凡一切風癰等症并宜治之

黃芩

酒炒

梔子

炒

蘇薄荷

各三兩

連翹

四兩

大黃

酒炒

玄明粉

各二兩

右為礮末每服四錢白水二鍾煎至八分去滓食遠熱

服

按是方黃芩梔子味苦而氣涼故瀉火於中連翹薄荷味薄而氣清故清熱於上大黃芒硝鹹寒而味厚故諸實皆瀉用甘草者取其性緩而戀膈也本作湯散而作散者取其泥膈而成功於上也

三黃丸

治三焦積熱上攻眼目赤腫下便赤澀大便結燥五臟俱熱腸風痔漏等症并皆治之

川黃連

黃芩

黃蘗

川黃連
黃芩
黃蘗
各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢空心白滾湯送下忌煎炒椒薑辛辣等熱物

按少火之火無物不生壯火之火無物不耗經曰壯火食氣是也故少火宜升壯火宜降今以三物降其三焦之壯火則氣得其生血得其養而三焦皆受益矣黃芩苦而枯故清熱於上黃連苦而實故瀉火於中黃蘗苦而潤故瀉火於下雖然火有虛實是丸但可以治實火若虛者用之則火反盛謂降多亡陰也丹溪曰虛火宜補則虛實之辨若天淵矣明者當求之證焉

一各三補丸

三補云何以黃連黃芩黃蘗三黃能

陰生故曰三補

按是方乃瀉中之補非補中之

補也若真以為補是向

痴人說夢也程巖泉曰人皆知

補之為補而不知瀉之

為補知瀉之為瀉而不知補之

為瀉豈知言哉

四季三黃瀉心丸

治男婦三焦積熱上焦有熱攻衝眼目

赤腫頭項疼痛中焦有熱心

膈煩不安飲食下焦有熱小便

赤澀大便燥結五臟

俱熱即生疳瘕瘰癧及治五般

小兒積熱亦宜服之

大黃

酒浸九蒸晒着秋

黃連

酒炒春四夏五

黃芩

酒炒春四夏五

右為細末煉蜜為丸或川水送

為丸亦可如梧桐子大

每服二三錢，白湯送下。

按味之苦，苦能降火，黃芩味苦而質燥，黃連味苦而氣燥，大黃苦寒而味厚，質精則上浮，故能降火於膈，氣燥則就火，故能瀉火於心，味厚則喜降，故能瀉邪攻實，此天地親上親下之道，水流濕，火就燥之義也。

青州白丸子

治男婦半身不遂，手足麻木，口眼喎斜，痰涎壅盛，及一切風症，藥所不能療者，小兒驚風，入血風並宜服之。

是頭眩、口眼喎斜、痰涎壅盛、及一切風症，藥所不能療者，小兒驚風，入血風並宜服之。

天南星

生三兩

白附子

二兩半

以水浸洗過日大者用七兩

川烏頭

去皮臍五錢，各生用。

右為細末，以生絹袋盛，用井華水攤末，用者更以手揉。

令出如有汗更不可入絹袋搥淨為度放磁盆中日曬
夜露至晚藥水別用井華水攪又晒至來日早再換新
水攪如此者五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾後
如玉片碎研以糯米粉煎粥膏為丸如紫豆大初服五
丸服至十五丸生薑湯送下不計時候如癰癰風以酒
酒下二十九日進三服至三日後當有汗便能舒展服
經三五日漸愈如痰壅膈止次用吐法

右共為細末每服三錢用薑汁調服吐痰為度

大承氣湯

治陽明胃經積熱攻其其脉沉實喘滿疼痛壯
運紅腫生瘡果發果指久服寒涼之劑太過以
致寒果火邪結熱未除積于腹內秘結
不通治宜通導行大便平實便通可也

卷六

鋪綴大黃

酒洗

芒硝

各三錢

厚朴

去皮

炙

二錢

右為劑水四鍾先煮厚朴和實至二鍾入大黃煎二三

沸去渣溫服取利為度如未利再投一服

按經云燥淫所勝以苦下之大黃之苦寒以瀉實熱相

實之苦辛溫攻腸胃雍滯潤燥除熱又燥淫於內治以

苦溫厚朴之苦辛溫破腹中結燥又曰熱淫所勝治以

鹹寒芒硝之鹹以攻蘊熱之堅痞

通湯治少陰腎水客寒白利宜通陽氣溫中散寒

藥四

乾薑二錢

附子

製過

水二鍾煎服木方加人尿猪膽汁苦寒使熱藥不為寒

此方乃內經所謂甚者從治之法是也

下寒者治傷寒邪熱內蓄伏飲以致頭疼心下痞滿引脇

故用芫花之辛以散飲苦以泄之故用甘

遂大戟之苦以泄水大棗之甘以益脾土

芫花錢半甘遂四分大戟一錢大棗六枚

共為一劑白水一鍾先煎大棗至八分入前三味同煎

或共為細末每服二錢用薑汁調服吐痰為度

除痰湯治風痰

生薑錢二廣陳皮去白枳實去穢赤茯苓甘草多

膽南星各一
右剉齊白水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

按風痰者濕土生痰痰生熱熱生風也牛耳陳皮茯苓
甘草前之二陳湯耳加南星以治風痰大枳實白痰如
倒壁

保命集當歸湯

治弱婦
益血

當歸身

黃芩

赤芍藥

各一錢半

柴胡

川黃連

各一錢

甘草

六分熟地黃二錢

右剉剉白水二鍾煎至八分去滓溫服

保命集羚羊角散

治水弱久
下去白

羚羊角

細末

升麻

北細辛

各等分

甘草

炙減半

右為細末

一半煉蜜為丸每服五六十丸用一半為散

以清熱瀉火不尤于食後送下

散服二錢至心涼湯送下

濟陰地黃丸 治三陰虧損虛火上炎致目睛散大厥物不

等症其功効與六味還少丹相似

遠志 當歸 山茱萸 菊花 肉蓯蓉 山藥

巴戟肉 枸杞 熟地黃 麥冬 去心各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四十丸空心滾

湯送下

點眼藥法

凡治目點眼藥必按時候每日須過巳至午始點蓋人之

陰陽與天地同子後一陽生午後一陰生正是陽主之

卷之五
上

際火亦生焉若點藥犯之則火勢難遏午後屬陰方宜
點藥或膏或散或蠟用屏簪骨簪如銳骨必蘸水乳磨
化如散則乾挑俱先耳少點些微若目受藥再累多些
不妨不可令虛目者疼而怕點即係仙丹患者畏懼要
在醫者輕手徐徐對病投藥所患者閉目仰面久坐不
動切戒妄想多言輕則可點二三次重則點三四次每
次必用簪撥淨藥滓不可過點過多點則未必爽快恐
激動其火反復增其患矣。

秘製點眼丹藥諸方

飛散

治目疾諸腫止淚明目去翳退赤定痛收濕除爛一切等症

一、藍甘石 火煨通紅用童便淨如此七次 明珠砂

琥珀 珍珠 牛黃 真熊膽 以上俱各另研 麝香

右和極勻每次用牙簪挑少許點眼閉目片時再點又

閉片時待藥性過然後用絳板主藥骨溫水洗淨每日

點二三次火閉為妙

附靈藥方

水銀 黑鉛 各五錢 火硝 八錢 官硃 二錢

先將鉛化開入水銀作一家再加硝硃研勻入陽城罐

內鹽泥封固打火二炷香先文後武待冷取出聽用

按此靈飛散所宜製也

醫按雲君砂珀珠末牛黃能勝者解毒清熱止淚退赤

明目之品也凡目有此症者俱可用

熊膽治一切大熱赤眼流淚翳膜

熊膽 鯢膽 鯢膽 猪膽 羊膽 川連 等分

右將膽藥入銀銚或銅銚中微火熬成膏取起用磁盒藏之山火毒熱眼神良

夫目症內熱則臉赤肝熱則目泣微熱則癢熱盛則腫

痛或癢或痛皆火之故也氣熱則神濁昏目故今晝不

能視物陽盛者喜水惡火故目不可以近燈光此經所

謂天明則日月不明邪害空竅也五臟之精是以清熱

用蜜之潤是以濟火且諸膽者乃甲木之精也蜜者百
花之精也皆有滋潤乙癸之妙焉

宋真宗皇帝勅封瓊液膏治日一切年久
難療等病症

熊膽 牛黃 礪砂 麝仁去殼皮
淨肉 黃連各五錢

龍腦分蜂窠一兩

右熊膽牛黃麝仁黃連四味長流水
碗傾於砂鍋

之內熬至半碗用重細紙濾過去滓加
蜜再用文武

火熬至紫色金焦離起絲絲為度不可太過
出火

礪砂龍腦研極細末和勻入磁罐內封固入
目

出火氣每餐服挑少許點於目內
目片時

方開每日點二三次仍忌一切動風之物

紫金錠子

治眼疾不分遠年近日諸般翳膜血灌瞳人絲肉翳睛奪毛倒睫遠年赤腫暴發赤腫白睛風

眼沙翳難開耗眼緊翳翳目目蓋明暗多物淚爛該風痰濕物昏花迎爛淚出目中溜火諸般目疾

蘆甘石

飛黃丹各半當歸 礪石各五 川黃連

硃砂

各二白礬生用 硃砂製白丁香 輕粉 龍齒

石蟹

蝦飛海螵蛸 熊膽 乳香 沒藥 白珍珠

麝香

各一錢梅花片二錢其片麝久留氣味走泄宜諸藥合畢加入

右除腦屑外餘各另製為末秤合和勻次黃連水杵至

千萬餘下自乾次入麝香研細羅過又次入片腦再研

復羅入後膏搜和作錠子陰乾

猪胰子

四枚以稀草木洗去膏膜乾淨無油為度再用布包漏爛入藥

生地黄

片一

當歸

四兩

黃連

半斤

防風

龍膽草

黃蘗

各二兩

麥仁

去皮殼

大鵝梨

八枚

蜜

入兩另熬

待乾為度

右將黃連等八味洗淨剉碎以水浸於銅器內春夏三

秋四冬七日濾去滓復將水

次取盡藥力以蜜絹

綿紙重濾過澄去砂土慢火煎

乾各四十九條

互換一順攪不住手攪得此藥如飴糖入蜜和勻

磁器盛放湯瓶口上重湯蒸炮成膏復蘸淨滴入水中

沉下成珠可丸為良待數日出火毒再焙化入末和包

杵搗為丸錠陰乾金銀箔為衣每以少許新汲水調佳

開鴨毛蘸點眼大背內又可以熱水泡化作洗眼藥亦
可如冰冷再煖用日洗五六次日點二三次大効
陽丹藥品法製

蘆甘石眼科之要藥也選輕白者佳四兩用

蘇薄荷 羌活 防風 麻黃 荆芥穗 川芎

白芷 細辛

發散之藥各二錢用清河水或雪水更妙四大碗煎至
二碗去滓將甘石槌碎入藥水中於瓶內煮乾爲度此
陰製用陽藥煎水法也又用

龍膽草 黃芩 赤芍藥 大黃 生地黃 黃連

木賊草

連翹

劉寄奴

黃蘗

夏枯草

當歸

千里光

菊花

山枝仁

舌寒之藥各二錢用井水五碗春夏浸二日秋冬浸四

日常以手攪之浸畢去滓將藥水分作清濁二碗將所

煮甘石大陽城罐內大火煨紅鉗出少時先以濁水淬

入再煨再淬以水盡爲度此陽製用陰藥浸水法也又

將前陰製煎水藥滓及陽製浸水藥滓其合一處浸水

二碗去滓過濾淨再澄清將煉過甘石傾內研搗浸露一

宿飛過分輕重兩處晒乾上者爲輕下者爲重各研極

細收藏輕者治輕眼重者治重眼此陽丹合制用藥之

法也。點甘石經水煉。水陽藥也。又川發散藥製。麝是辛
甘發散為陽之象。故以陽丹名。又用陰藥為陰製。是
陽中亦有微陰之象。及治火毒法也。

陰丹藥品法製

銅絲

黃連水煮飛過一錢五分

青鹽塊

白水洗

乳香

各三分

礱砂

日草水洗六分

蜜陀僧

飛過二分

沒藥

三分

又將前製陽丹。庶甘石一兩。共七味。俱研極細。勿令犯
火。所以為陰藥也。中用陽丹。甘石者。為陰中有陽之象
也。但只用蘇州薄荷。淨葉。川黃連。龍膽草。三味。各等分。
浸水二盞。露一宿。去滓。瀝淨水一盞。入前藥在內。調勻。

明月下露一宿而得月之陰氣次日晒乾又得日之陽氣也候夜露日晒透乾再研極細入後藥此製陰丹之法也

川黃連

去皮毛洗淨乾六分三厘

草烏

新白者六分

細辛

去土藥五分

胡黃連

條實者洗淨乾四分

薄荷

要蘇州淨藥洗淨晒乾三分

以上五味乃疏風退熱之藥取象於五輪之義也各研極細拌勻用人乳爲丸如小豆大用絹袋盛之懸於東屋角頭風乾再研極細篩過和前藥內共研勻又入後藥

生薑粉用大酒釀四五塊竹刀齊中切開剉孔以黃連末填孔內蒸細色火烘取出用烏雞白鹿血薑汁晒

乾一 硃砂 明者飛黃連水飛過 白丁香 直者

粉霜 各一 螺蛳 去粗皮研 輕粉 各一 製牙硝 四兩

血竭 艾葉研 雄黃 飛過二 珍珠 細研

以上陰丹藥味其和一處研極細用磁罐收貯是為陰

丹藥雖頗峻但合時有輕重緩急之分而有病輕則輕

病重則重之法也如用者須當斟酌

配合陰陽法式

前所製陰陽二丹無獨用之理所謂孤陽不生孤陰不
長之義然配合之法其名有五取陰陽生五行之義也
開列於後

右藥研有先後。二丹為先後所配。如加粉砂。礬味為次。而片磨則又候諸藥研至極細時。方可加入同研。凡合眼藥。皆依此法。而粗細須以舌嘗之。大抵女人眼藥。宜從右轉。男子宜從左轉。否則治目有反攻之患。須識此意。

九金丹

陽丹九分 陰丹一分 明砂一分 玄川粉一分 萬應月練一分

麝香二厘 水片三厘

二八木丹

陽丹八厘 陰丹二厘 粉霜二厘 玄明粉二厘 萬應月練一分

明礬一分 麝香二厘 梅花片三厘

三七水丹

陽丹七分 陰丹三分 粉霜四厘 硼砂一分 麝香一厘
冰片三厘 此丹不用礬

四六火丹

陽丹六分 陰丹四分 粉霜六厘 硼砂一分 明礬二厘
麝香一厘半 冰片三厘

陰陽合配土丹

陽丹五分 陰丹五分 粉霜八厘 硼砂二分 明礬二厘
麝香一厘 冰片三厘 俱研如前法

用丹頭大要

前所配合諸丹按陰陽生五行之義也其輕重之分則
金丹爲輕而木丹水丹則漸加重暴發赤眼近年翳膜
可以酌點者也至若火土二丹則爲峻重遠年老翳膜
努肉攀睛方可施治可暫點數次不可常點所謂邪輕
則輕邪重則重又須量人眼內容受何如以意推裁不
必拘執故曰神而明之存乎其人然點眼宜飽治重眼
須用吹若翳膜在眼珠上必吹可到吹較點多有神效
眼輕則不可吹吹點後則以桑白皮側柏葉煎水稍熱
洗之一可以退散赤脈三可以洗去藥毒切勿用冷水

洗忌寒涼點至將愈時則不可過點蓋留有餘不盡之意恐過點以致復發須識此意

不損金撥雲丹

治一切遠年近日翳障皆能復明

大石盤

一個為則

大黃

桔梗

川黃連

黃蘗

黃芩

防風

荆芥穗

羌活

烏藥

陳皮

蘇薄荷

枳殼

乾薑

前胡

桑白皮

薑黃

細辛

當歸

木賊草

菊花

柴胡

各等分

右將二十二味細剉用水五大碗放銅器內浸三日將

布濾去滓却將石盤微火煨令紫色入藥汁內蘸冷取

起細研為末就將藥水淘飛浮清者以淨器盛淨水安

靜室勿動以物覆器上毋使塵垢入內俟其澄清傾去藥水以蟹粉曝乾取用配合後之諸藥

蟹粉

坯子

各五錢

熊膽

明礬砂

膽礬

各一錢

銀硃

輕粉

麝仁霜

硃砂

各錢

川椒

黃連

夜明砂

牛黃

珍珠

冰片

各五錢

巴豆霜

血竭

金墨

各二錢

右各依製法合礪一日極細無聲磁罐貯之聽用名曰丹頭隨病輕重加減照服其効如神

輕號

丹頭

五分

冰片

一分

麝香

三厘

坯子

一錢

有共蠟燭制藥一切風熱暴赤爛疔迎風冷淚怕熱

若則或兼半年一發或一年數發發作無時悉以輕劑
點之不可輕用重藥病輕藥重反受其害病服合病之
劑爲助

次輕號

丹頭六分 冰片一分 麝香三厘 牙子一錢
右共研極細專治久患不瘥珠上必生薄翳或有紅筋
赤膜悉以此次輕藥點之每日二四次若見退減日點
一二次愈則勿點

重號

丹頭七分 冰片一分 麝香三厘 牙子一錢

石共蝸極細治眼患頗重或翳障垂簾咸赤滯痛澀用
此吹點每日三四次目漸愈卽止吹藥點數亦減內服
稍輕藥爲愈

至重號

丹頭九分水片二分麝香三厘坯子一錢

右共蝸極細專治重眼厚膜遮睛釘白翳昏無見方
點此藥每日點二三次漸愈漸減

秘授製蘆甘石法

用好田泥做成大高球二箇外以硃砂硝石不拘多少
共爲末卽將所做高二箇口中曝乾極透川上好羊腦

甘石一斤裝在筒內將珠相合又用前礪醋鹽水調藥
固濟又用泥包過以乾爲度以大炭過固架之居中煨
至三炷香盡色如松花樣爲度取出淬入童便內暴乾
蠟一遍淨土者逼在一處重澇不碎者裝大照前後煨
又淬再蠟又逼所沉者石脚不用細末須炙烘得極乾
再用三黃湯開列於後煮過晒乾收貯聽用

煮蘆甘石三黃湯藥味

川黃連 黃蘗 川羌活 黃芩 山梔仁 防風

木賊草 蟬退 家菊花 白芷 蘇薄荷 細辛

青歸身 川芎 荆芥穗 大黃 赤芍藥 連翹

右剉一劑白水四碗煎至二碗去滓澄清人煨過甘石
煮之

取永粉法

此粉如遇炭火症配炭火藥驚風症
配驚一藥每劑中加四厘無有不効

汞一兩鉛二錢五分鐵杓鎔化另放冷定再將白礬汁
硝皮硝皂礬各五錢青鹽二錢炒乾再入鉛汞共研極
細入罈升打鐵蓋北好硃砂鹽泥固濟三釘駕於火上
先川文一炷後武二炷爲度武火時以新羊毛筆蘸水
盪內盡固香盡待冷開取用

製硃砂法

用好硃砂五錢以初生男兒乳汁濕透煨古鏡背面礬

蓋密布包定埋土內四十九日取出走綠的是活砂聽

眼科取靈砒法

白砒五錢爲末用牙硝白麝香一箇切如豆大將砒拌勻用烏公雞一隻餓二日將麝喂之食盡半頓飯時殺雞取出淘淨入罐內封固打火三炷香取升盞靈砒再用多年老鷄油拌砒封固放淨處四十九日去油加麝仁去殼皮五錢黃連三錢生砒五分俱爲末再火罐內打火取出聽用

驅蟲方

用虎掌草根燒灰點之努肉并點亦妙

點膜老障驗方

凡難退翳障須用是藥點除如畏痛勿用治之

附錄二兩要

人言七分

番樹砂一錢

共研細大陽城礮內打火先文後武礮口留一孔出烟以烟盡為度埋土中一宿去其火毒次早開出研極細末加銀硃一分二厘再研勻似桃紅色收貯礮內聽用

收淚散

治風淚不止

綠蘆甘石

製散飛細一錢

海螵蛸

五分梅花片

少許

共研極細點出淚發處

凡蟹睛不收捉大白花蜘蛛數箇用陰陽瓦焙乾研細末

或滾於丸藥上或溫酒調服即收神効

敷眼諸藥方

玉龍丹 治一切火眼赤腫

明礬 六分 沒藥 二錢 乳香 二錢 蘆甘石 一分 煨飛過

珍珠 一錢 黃丹 飛淨 歸身 七分 梅花片 三分

共研爲極細煉蜜爲丸銀硃五分爲衣收貯聽用如用
將井花凉水磨塗眼皮外立効

散血膏 治赤腫不能開
睛痛熱淚如雨

紫金皮 白芷 生黃柏 大黃 赤小豆 南星

寒水石 薑黃

右各等分爲細末生地黄汁調成膏敷眼四圍

清涼膏

南星

生用

蘇薄荷

各五錢

荆芥

百藥煎

各三錢

右爲細末井水調成膏貼眼角上自然清涼

搜風散

治風熱眼及腫痛

川黃連

大黃

朴硝

黃丹

右等分爲末以苦參同煎湯外煎過日蜜同調敷眼

四苳甚效

洗眼諸藥方

神仙碧霞丹

能治內外諸障

當歸 沒藥各二錢 血竭 白丁香 硼砂 片腦

麝香 馬牙硝 乳香各五錢 黃連三錢 銅絲一兩五錢 爲衣

右爲細末 葵黃連膏和丸如雞頭實大 每用新汲水半

盞於磁盒內浸常用 每一丸可洗四五日 大病不過一

月 小病半月 冷淚流出見効

洗眼弦風赤眼方 其効如神 此藥人家不可少 無目

黃參 錢四 五倍子 荆芥穗 防風 黃連 各三錢 銅絲五

右爲細末 外以蘇薄荷煎湯丸如彈子大 臨時用以熟

水化開洗眼 每日三次 立愈神効

洗眼紅聚兒 治不論年久眼

風眼俱可洗

皮硝一斤滾水泡化澄清去滓取上好紅棗兒一斤去
 核入硝汁內浸一日取晒乾又浸如此數次以汁盡為
 度子羽瑯瑤兒一箇裝黃連末三分小者二分將棗仍舊合
 之勿令洩氣用時取棗一箇投白滾湯泡之不時洗眼
 極妙

治眼吹藥諸方

立應散治內外障翳昏澀多淚及暴赤眼

躑躅花洗淨 香白芷 當歸 雄黃另研 川附子炮

鷺不食單洗淨各等分

右為細末入麝香少許和勻合水噴鼻內去盡涕淚

候為按

諸症散治取時疫紅赤身之症時疫紅赤身之症時疫紅赤身之症

毛倒脫一
切服症

羌活 獨活 川芎 枳殼 葛根 黃芩

白芷 荆芥 白芍 風乾硝石 黃連 黃柏

黃連 黃柏 三棱 莪朮 三三

白為細末次酒中一二日或酒

青火金鐵治六氣赤腫及

鐵硝 青礬 蘇薄荷 川芎 各五

石為細末分患人口湯水以管吹入鼻內酒歸散酒主

淨為愈

赤次金鐵

治赤眼頭風冷淚
並去耳鳴并寒者

微硝南川芎

雄黃

乳香

沒藥

石

右為細末每用一二分如神

通頂散

治風毒火眼

香白芷

細辛

藿香葉

各七

躑躅花

三

右為細末每令病人先嚥

冷水

一口

然後

隨

挑陷於鼻內以手擦兩太陽穴

止痛藥方

乳香

治眼疾並痛藥且皮

五靈脂二不乳香

沒藥

草烏

夏蠶砂

各五

木鱉子

五枚

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服七丸薄荷湯或茶清任意送下如頭疼痛甚三服卽止

按乳香沒藥總爲定痛之要藥也必審其痛之源而佐之以乳沒則其効速也如有風而痛者用散風藥中加乳香沒藥則痛可止如血滯而痛者當用行血藥中加乳香沒藥而痛卽止如熱鬱而痛者當用清熱藥中加乳香沒藥而痛卽止今人不工於此而惟恃乳香沒藥定痛服之而痛不止者不知治痛之所在也乳香沒藥

竟能奈之何哉而徒嗟其藥之不効弗思甚耳

神仙拈痛散

治一切暴發火眼疼痛晝夜不止

生明礬

揀上白明透者佳研極細如粉樣

右用雞蛋清共礬粉調勻將鷺翎毛搽腫眼胞疼痛之處如乾再搽數次其痛即止

傅氏眼科審視瑤函卷之六終